

Informazioni sull'aborto con farmaci

L'aborto farmacologico può essere eseguito fino alla 7a settimana di gravidanza. L'aborto viene eseguito in regime ambulatoriale. Durante l'esame preliminare è necessario stabilire che la gravidanza è durata meno di 49 giorni. Successivamente, la paziente assume una compressa di Mifegyne 600 mg o 3 compresse di Mifegyne 200 mg (Mifepristone o RU 486) per interrompere la connessione tra la placenta e l'utero. Nel 5% delle donne, le espulsioni si verificano già nei due giorni successivi. Tuttavia, poiché non è possibile stabilire con certezza se il processo abortivo sia già avvenuto, la paziente deve comunque inserire 2 compresse di Cytotec per via vaginale. Il Cytotec è un farmaco che provoca la contrazione dell'utero e la dilatazione della cervice, con conseguente espulsione definitiva.

Questo processo può essere molto doloroso, per cui si consiglia di assumere preventivamente un antidolorifico come l'acido mefenamico. In caso di dolore molto forte, somministreremo compresse di tramadolo.

La compressa di Mifegyne sarà assunta in presenza di un medico. Le compresse di Cytotec, che portano all'aborto definitivo, vengono assunte a casa. Si raccomanda vivamente la compagnia e il supporto di una persona fidata il giorno in cui la paziente assume le compresse di Cytotec.

Costo: Compreso l'esame preliminare, l'aborto farmacologico costa tra i 600 e i 900 franchi. I costi sono coperti dall'assicurazione sanitaria. Vi preghiamo di portare con voi la tessera dell'assicurazione sanitaria, in modo da poter inviare direttamente la fattura.

Gruppo sanguigno: Portate con voi la tessera del gruppo sanguigno. Se siete Rhesus negativi, in caso di intervento dovremo iniettarvi degli anticorpi Rhesus.

Segreto medico: Non siamo obbligati a informare nessuno di questo intervento, soprattutto il vostro partner o i vostri genitori, a meno che non ci esoneriate esplicitamente dall'obbligo del segreto medico nei confronti di queste persone.

Dr. med. Benjamin Stutz