

## Información sobre el aborto con medicamentos

El aborto con medicamentos puede realizarse hasta la séptima semana de embarazo. El aborto se realiza de forma ambulatoria. Durante el examen preliminar hay que determinar que el embarazo ha durado menos de 49 días. A continuación, la paciente toma un comprimido de Mifegyne 600 mg o 3 comprimidos de Mifegyne 200 mg (Mifepristona o RU 486) para romper la conexión entre la placenta y el útero. En el 5% de las mujeres, las expulsiones se producen ya en los dos días siguientes. Sin embargo, como no se puede determinar del todo si el proceso de aborto ya se ha producido, la paciente necesita introducir dos comprimidos de Cytotec por vía vaginal en cualquier caso. Cytotec es un fármaco que provoca la contracción del útero y la dilatación del cuello uterino, lo que provoca la expulsión definitiva.

Este proceso puede ser muy doloroso, por lo que aconsejamos tomar previamente un analgésico como el ácido mefenámico. En casos de dolor muy intenso, administraremos comprimidos de Tramadol.

El comprimido de Mifegyne se tomará en presencia de un médico. Los comprimidos de Cytotec, que conducen al aborto definitivo, se toman en casa. Recomendamos encarecidamente la compañía y el apoyo de una persona de confianza el día en que la paciente tome los comprimidos de Cytotec.

**Coste:** Incluyendo el examen preliminar, el aborto con medicamentos cuesta entre CHF 600 y 900. Los costes están cubiertos por el seguro médico. Por favor, lleve su tarjeta de seguro médico para que podamos enviarles la facturación directamente.

**Grupo sanguíneo:** Por favor, lleve su tarjeta de grupo sanguíneo. Si usted es Rhesus negativo, tendremos que inyectarle anticuerpos Rhesus en caso de una operación.

**Secreto médico:** No estamos obligados a informar a nadie sobre este procedimiento, especialmente a su pareja o a sus padres, a menos que usted nos exima explícitamente de la obligación de guardar el secreto médico respecto a estas personas.

*Dr. med. Benjamin Stutz*